

È IMPORTANTE SAPERE CHE:

La lotta alla zanzara tigre non può avere esiti positivi senza un coinvolgimento della popolazione. I siti a rischio di infestazione da zanzara tigre nelle aree pubbliche sono infatti solo il 20-30% del totale. Il rimanente 70-80% delle zone a rischio è di proprietà privata.

E' quindi necessario che i cittadini mettano in atto misure di prevenzione e di trattamento nelle aree di loro competenza come da immagine riportata all'interno del pieghevole.

Si raccomanda, dove non è possibile rimuovere i ristagni d'acqua, di effettuare interventi larvicidi con preparati di nuova generazione, a base di silicone, (polidimetilsiloxano – PDMS), che creando un sottile film sulla superficie dell'acqua, impedisce alle larve di respirare. Questi preparati sono efficaci per almeno 4 settimane e inibiscono anche la deposizione delle uova.



Gli insettivori come rondini, rondoni, balestrucci e pipistrelli che si nutrono ogni giorno di migliaia di insetti, per questa loro funzione sono sempre stati tutelati dalla legge. per chi distrugge i loro nidi è previsto sino a un anno di reclusione e diecimila euro di multa

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE INFORMA A PROPOSITO DI:

- > TRATTAMENTI LARVICIDI E ADULTICIDI CONTRO LE ZANZARE IN AREE PUBBLICHE E PRIVATE
- > ORGANIZZAZIONE DI CAMPAGNE INFORMATIVE
- > ORDINANZE E CONSIGLI PRATICI
- > BONIFICA DEI FOCOLAI LARVALI IN AREE PRIVATE



SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA
DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

📍 Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova
☎ 0376 334111

ZANZARA TIGRE

COSA FARE!
IL MASSIMO RISULTATO
CON IL MINIMO IMPEGNO



COSA FARE



Non lasciare all'aperto oggetti che possono trattenere acqua (*vasi, sottovasi, secchi, ecc.*) perché le zanzare vi depongono le uova, sviluppandosi in larve e poi in adulte.



Eliminare i sottovasi. Se la pianta o il fiore hanno bisogno di acqua, riempire il sottovaso con sassolini di ghiaia per impedire lo sviluppo delle larve di zanzare.



Coprire con coperchio o rete zanzariera i bidoni di raccolta acqua utilizzata per irrigare gli orti. Se non sono utilizzati tenerli capovolti.



Mantenere l'erba del prato falciata e le siepi ben curate, per impedire che gli adulti di zanzara trovino facile riparo, specialmente la zanzara tigre.



Nei pozzetti di raccolta acqua piovana eseguire regolarmente il trattamento con prodotti antilarvali per impedire lo sviluppo delle larve. In alternativa coprire i pozzetti con zanzariera.

TRATTAMENTO ANTILARVALE NEI TOMBINI DI RACCOLTA ACQUA PIOVANA

DATA TRATTAMENTO
(ogni 15-20 giorni)

APRILE		
MAGGIO		
GIUGNO		
LUGLIO		
AGOSTO		
SETTEMBRE		
OTTOBRE		

COSA AVVIENE OGNI MESE

Nascita delle
prime **LARVE**
di zanzara tigre



Gli **ADULTI** di
zanzara tigre
depongono le prime
uova primaverili



Presenza
di **MOLTE**
zanzare tigre



Inizia il periodo di
MAGGIOR PRESENZA
delle zanzare.
Bisogna assolutamente
impedirne lo sviluppo



Continuare il **TRATTAMENTO**
ANTILARVALE perché le
condizioni climatiche sono
ancora favorevoli allo sviluppo



Anche se fa freddo sono
ancora molte le **ZANZARE**
TIGRE che si possono
sviluppare nei tombini

